

## Les étoiles en mouvement

François Mignard, Observatoire de la Côte d'Azur, laboratoire Lagrange

*Un grand récit qui explique comment les hommes sont passés d'une vision statique de l'Univers où les étoiles occupaient des positions précises les unes par rapport aux autres sur la « sphère des fixes » à un monde dynamique où chaque astre possède sa vitesse propre. Une étude minutieuse indique les méthodes modernes permettant de réaliser des mesures.*

Au cours des longs siècles qui jalonnent l'histoire de l'astronomie, les étoiles ont été rassemblées au sein de constellations dont la forme immuable ne laissait guère prise au doute. Aucun mouvement n'était décelable à l'échelle d'une vie humaine et des comparaisons d'alignements décrits par plusieurs générations d'astronomes confirmaient cette permanence. L'existence des cieux inaltérables au-delà de l'orbe lunaire avait fini par s'ériger en une doctrine difficile à contester.

Cette belle image s'est profondément altérée depuis le XVII<sup>e</sup> siècle, à la fois pour des raisons théoriques et comme conséquence d'observations nouvelles qui remettaient en cause la fixité des cieux. Sur le plan théorique, la mécanique de Newton impliquait le mouvement permanent des astres massifs les uns par rapport aux autres dans la profondeur de l'espace, ainsi que l'instabilité d'un monde fini réglé par les lois de la gravitation. Ceci fut suivi d'observations décisives au début du siècle suivant qui prouvaient sans doute possible que les étoiles n'occupaient pas des positions relatives immuables sur la sphère céleste et que des mouvements très lents étaient décelables. À la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, l'analyse des spectres mettra définitivement fin à cette image réductrice du monde avec la mise en évidence également d'un déplacement sur la ligne de visée. Tout ceci a été largement confirmé et étendu à l'ensemble des étoiles et plus tard des galaxies avec des conséquences fondamentales sur la structure de l'Univers. Dans ce texte, je retrace ces deux grandes étapes de l'astrométrie stellaire et ambitionne de montrer l'importance de ces découvertes pour la recherche moderne.

### La sphère des fixes

La sphère des fixes n'est pas un dogme posé a priori pour des raisons de simplicité ou d'harmonie, mais un modèle scientifique du monde sidéral adopté à la suite d'observations soigneuses. En introduction

du Livre VII de l'Almageste, Ptolémée (90-170 environ) prend grand soin d'apporter les preuves les plus sûres de l'absence totale d'un quelconque déplacement des étoiles les unes par rapport aux autres. Utilisant principalement les observations d'alignements rapportées par Hipparque (-190 ; -120 environ) près de trois siècles plus tôt, il ne note aucun changement perceptible durant cet intervalle conséquent. L'argument est très détaillé et porte sur plusieurs dizaines d'alignements ou de figures géométriques simples et remarquables. L'ensemble occupe cinq pages de l'ouvrage et le conduit à conclure à l'absence de mouvement sensible et à justifier le concept de la sphère des fixes. Par exemple, Hipparque rapporte que les étoiles  $\alpha$  Cancri (Acubens),  $\beta$  Cancri (Altarf) et  $\alpha$  CMi (Procyon) sont quasiment sur une même ligne sur le ciel et Ptolémée retrouve cet alignement. Bien entendu, l'ensemble de la sphère céleste est emporté par une rotation de 24 h, mais ce mouvement est de nature très différente et ne modifie pas les positions relatives, les alignements ou la forme des constellations.

Avec Copernic (1473-1543) la sphère céleste s'immobilise davantage puisque son mouvement global n'est qu'une apparence liée à la rotation de la Terre sur elle-même et non plus un mouvement réel d'une sphère cristalline. Les étoiles sont repoussées à des distances *immenses*, au sens propre, *immensus* signifiant au-delà de toute possibilité de mesure, alors que pour les astronomes antiques cette sphère matérielle se situait à quelques pas au-delà de la sphère de Saturne. Cet élargissement du monde était une nécessité dans le système héliocentrique pour être en accord avec l'absence de mouvement parallactique décelable des étoiles. Il fallait qu'elles fussent à des distances sans commune mesure avec celle de l'orbe de la Terre.

Il faudra la hardiesse intellectuelle de Giordano Bruno (1548-1600)<sup>1</sup> pour faire éclater le monde

<sup>1</sup> Le Banquet des Cendres (*La Cena de le Ceneri*), III<sup>e</sup> dialogue.

des fixes et la finitude du monde, dans une œuvre protéiforme plus philosophique que scientifique, vite tombée dans l'oubli et qui eut peu d'influence sur le cours de la science au moment où Tycho Brahé (1546-1601) donnait la priorité à l'observation sur la spéculation et où la mesure et l'expérience devenaient les sources premières du savoir avec Galilée (1564-1642). L'Univers devient infini et peuplé d'étoiles innombrables dont aucune n'est le centre du monde et le mouvement en est la règle. Son univers n'est pas seulement infini (ce que l'on en retient en général), il est aussi animé (ce qui est plus important pour le propos de ce texte).

## Découverte du mouvement des étoiles

Cependant la véritable rupture vécue comme telle par les astronomes praticiens et concernant le déplacement vrai des étoiles arrive en 1716 lorsque E. Halley (1656-1742) met en doute l'immobilité des étoiles à partir d'observations et non sur une base spéculative. Dans une courte communication à la Royal Society, *Considerations on the Change of the Latitudes of Some of the Principal Fixed Stars*, le célèbre astronome attire l'attention sur les changements de positions des étoiles Sirius, Arcturus et Aldébaran, dans l'intervalle de 1800 ans<sup>2</sup> séparant les mesures récentes de celles rapportées par Ptolémée. Les données se concentrent sur la latitude écliptique qui, contrairement à la longitude ou aux coordonnées équatoriales, n'est pas sujette aux changements et incertitudes venant de la précession.

( 736 )

---

I. *Considerations on the Change of the Latitudes of some of the principal fixed Stars.* By Edmund Halley, R. S. Sec.

*Fig.1. Titre de l'article de E. Halley au Philosophical Transactions dans lequel il annonce le changement de latitude écliptique de quelques étoiles.*

Halley estimait que ces trois étoiles présentaient en 1717 un changement de latitude vers le sud respectivement de 20', 22' et 33'. Mais dans l'intervalle de 18,5 siècles, l'écliptique s'est déplacé par rapport aux étoiles et, une fois effectuée cette correction, il reste un mouvement vers le sud de l'écliptique de 37', 42' et 33', soit typiquement des variations de l'ordre de la seconde de degré par an. À noter que les positions dans le catalogue de Ptolémée ont une précision de l'ordre de 20' et donc

<sup>2</sup> Halley considère que les coordonnées de l'Almageste sont en fait des valeurs prises chez Hipparque environ en 130 BC.

le mouvement pointé par Halley est juste significatif pour une étoile mais prend du sens par sa répétition sur plusieurs sources indépendantes.


Il reviendra à Jacques Cassini (1677-1756) d'apporter la preuve quantitative du déplacement des fixes dans un mémoire présenté à l'Académie en 1738 et dans lequel il compare des positions d'Arcturus de Tycho Brahé (vers 1580), d'autres obtenues par J. Richer (1630-1696) lors de son voyage à Cayenne en 1672 et ses propres mesures effectuées à l'Observatoire de Paris. Par comparaison avec des étoiles voisines, Cassini établit définitivement qu'il ne s'agit pas d'une conséquence du changement du plan de l'écliptique, qui aurait affecté les étoiles proches de la même quantité, mais bien d'un déplacement de l'étoile par rapport au fond du ciel.

Tobias Mayer (1723-1762), malgré la brièveté de sa vie scientifique, s'est illustré par des travaux de premier ordre sur le mouvement de la Lune et la sélénographie et apporta une contribution décisive à la question des mouvements propres. L'astronome et historien de l'astronomie J.B. Delambre, peu prolix en éloges, le qualifiait non seulement de plus grand astronome du XVIII<sup>e</sup> siècle, mais de tous les temps et de tous les pays. T. Mayer est parvenu à mesurer le mouvement propre d'une quinzaine d'étoiles, sur une liste de 80, par comparaison à des positions obtenues par O. Römer 50 ans plus tôt. Dans son traité *Commentary on the proper motion of the fixed stars* il considère que le Soleil pourrait avoir un mouvement dans l'espace et que, dans ce cas, cela devrait être observable par une divergence du déplacement des étoiles dans la direction du mouvement du Système solaire. C'est bien ce que trouvera W. Herschel peu de temps après à partir des données laissées par T. Mayer.

## Terminologie et conséquences

Ce déplacement des étoiles dans le temps les unes par rapport aux autres est qualifié de mouvement propre, pour le distinguer des mouvements apparents comme l'aberration ou l'effet parallactique, qui proviennent du mouvement de l'observateur ou ceux liés à la précession qui sont totalement artificiels et résultent de la rotation du système de référence équatorial par rapport aux axes de Copernic. Le mouvement propre correspond à un mouvement réel de l'étoile (il lui est propre) et/ou du Soleil et se manifeste par un changement des coordonnées des étoiles dans le temps, lorsque ces dernières sont rapportées à un système de référence unique pour les différentes époques. Avec le temps, les positions relatives changent et la figure des constellations se

déforme, comme on le voit pour la Grande Ourse sur la figure 2, dont les positions il y a 100 000 ans ont été calculées à partir des données du catalogue Hipparcos, des vitesses radiales et en prenant pour les étoiles un mouvement uniforme dans l'espace.



**Fig.2.** La constellation de la Grande Ourse telle qu'elle apparaissait y a environ 100 000 ans. Les positions sont rapportées à  $\delta$  Uma (intersection du manche et du quadrilatère). Les mouvements propres sont tous de l'ordre de 0,1"/an.

Il s'agit bien ici d'une découverte majeure de l'astronomie de position avec de nombreuses conséquences. Tout d'abord sur le plan pratique, elle impliquait qu'un catalogue donnant la position des étoiles devait être mis à jour régulièrement. Plus précisément aux deux coordonnées de position (ascension droite et déclinaison par exemple) il fallait ajouter les deux composantes du déplacement annuel, c'est à dire la dérivée première des coordonnées, permettant de propager la position à une date différente de celle de la construction du catalogue.

Mais ce n'est pas là le point le plus important. Regardons plus près de chez nous le changement qu'apporte une vision dynamique par rapport à une vision statique de la Terre. On peut avoir une longue liste de coordonnées des différentes villes, ports, montagnes dans les différents continents et reporter cette information pour en faire une carte de haute

précision, bien suffisante pour tous les besoins de la navigation maritime ou aérienne. Mais s'apercevoir au moyen de mesures géodésiques réalisées à 10, 20, 100 ans d'intervalle que les distances entre des points situés de part et d'autre des océans changent dans le temps est une découverte de première grandeur et fait passer de la vision statique du globe à une monde mouvant avec des continents en déplacements relatifs. La portée est considérable, même si sur le plan pratique de la navigation les conséquences sont mineures. Il en va de même avec les étoiles : mettre à jour les catalogues est secondaire, mais comprendre que les étoiles ont un mouvement dans l'espace, que ce mouvement obéit probablement à des lois, qu'il y a probablement une cause sous-jacente commune, est une grande avancée dans la compréhension du monde et la mission spatiale Gaia de l'Agence spatiale européenne se propose d'y contribuer.

## Le mouvement propre au premier ordre

### Variation de coordonnées avec le temps

Les valeurs typiques des variations d'ascension droite ou de déclinaison sont de 0,01" à 0,1" par an, et exceptionnellement plus grandes que 1" par an. La plus grande valeur observée est celle de l'étoile de Barnard avec un déplacement annuel de 10,3", soit environ un diamètre lunaire en deux siècles. Si cette étoile avait été plus brillante, nul doute que Ptolémée aurait noté son mouvement (près d'un degré pendant les trois siècles le séparant d'Hipparque) avec les conséquences que l'on peut imaginer sur la sphère des fixes.

La liste des étoiles du catalogue Hipparcos ayant les plus grands mouvements propres se trouve dans le tableau 1.

HIP	$\alpha$ deg	$\delta$ deg	$V$ mag	$\pi$ mas	$\mu_\alpha$ mas/an	$\mu_\delta$ mas/an	$V_T$ km s <sup>-1</sup>	Name
87937	269.454	+04.668	9.54	549.01	-797.84	10326.93	89.43	Barnard'sstar
24186	77.897	-45.004	8.86	255.26	6506.05	-5731.39	161.02	Kapteyn's star
57939	178.233	+37.733	6.42	109.21	4003.69	-5813.00	306.38	Groombr. 1830
114046	346.447	-35.856	7.35	303.90	6767.26	1326.66	107.57	Lacaille 9352
439	1.335	-37.352	8.56	229.33	5634.07	-2337.94	126.09	CD -37 15492
104214	316.712	+38.741	5.20	287.13	4155.10	3258.90	87.18	61Cyg-A
104217	316.717	+38.734	6.05	285.42	4107.40	3143.72	85.91	61Cyg-B
54035	165.836	+35.981	7.49	392.40	-580.20	-4767.09	58.01	Lalande 21185
108870	330.823	-56.780	4.69	275.76	3959.97	-2538.84	80.86	$\epsilon$ Ind
54211	166.384	+43.524	8.82	206.94	-4410.79	943.32	103.32	
19849	63.823	-07.645	4.43	198.24	-2239.33	-3419.86	97.75	$\sigma^2$ Eri
70890	217.449	-62.681	11.01	772.33	-3775.64	768.16	23.65	$\alpha$ Cen-C

**Tab. 1.** Liste des étoiles ayant les mouvements propres les plus importants dans le catalogue Hipparcos. Le mouvement propre en ascension droite ( $\mu_\alpha$ ) et celui en déclinaison ( $\mu_\delta$ ) sont données en millième de secondes d'arc (mas) par an.

On remarquera que ce sont toujours des étoiles très proches, mais pas nécessairement brillantes. Le mouvement général d'une étoile simple sur le ciel pour un observateur terrestre est la résultante du mouvement propre, pratiquement rectiligne uniforme et du déplacement parallactique annuel qui est un effet apparent optique (parallaxe au sens strict) provenant du mouvement de l'observateur autour du Soleil et de la distance finie des étoiles. La figure 3 en donne une illustration qualitative.




Fig. 3. Déplacement sur le ciel dans un système de référence inertiel d'une étoile simple. Le mouvement apparent sur le plan du ciel est la résultante d'un déplacement systématique pratiquement uniforme (le mouvement propre) et des boucles annuelles de l'effet parallactique venant du mouvement de la Terre autour du Soleil.

### La vitesse radiale

On appelle vitesse radiale d'un astre la composante de sa vitesse sur la ligne de visée. Elle est généralement notée  $v_r$  et est exprimée en  $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$ . Elle est positive dans le cas d'un éloignement et négative si l'astre se déplace vers l'observateur. Alors que la vitesse tangentielle n'est pas directement accessible (l'observation ne donne que le déplacement angulaire), la vitesse radiale peut être mesurée en tant que vitesse par l'effet Doppler-Fizeau et non déduite de la variation de la distance (ce qui est théoriquement possible, mais est encore hors de portée de l'astrométrie moderne).

L'effet du mouvement de l'observateur sur la fréquence d'une onde a été introduit sur une base théorique en 1842 par Hans Christian Doppler (1803-1853) dans le mémoire *Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels* (Sur la lumière colorée des étoiles doubles et de quelques autres corps célestes). Doppler justifiait l'effet sur la lumière par une analogie avec les ondes acoustiques. L'effet fut confirmé expérimentalement et quantitativement pour les ondes sonores quelques

années plus tard par C.H. Buys-Ballot, mais bien plus tardivement pour la lumière au moyen de mesures astronomiques et son existence resta controversée pendant plusieurs décennies. Concernant la lumière elle-même et la couleur des étoiles, Doppler commet deux grosses erreurs dans cette étude. La couleur des étoiles n'est pratiquement pas affectée par le déplacement radial en raison du transfert du rayonnement IR ou UV vers le visible qui compense le déplacement de la partie visible. De plus les vitesses nécessaires, proches de  $100\,000 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , sont sans rapport avec les vitesses orbitales des composantes des étoiles doubles. À noter que ce mémoire ne fait aucune allusion à la mesure des vitesses radiales et la nécessité de travailler sur des spectres de raies et non sur le spectre continu.

La formulation correcte pour les ondes lumineuses revient au physicien Armand Hippolyte Fizeau (1819-1896) dans un travail totalement indépendant présenté à la Société Philomatique de Paris en 1848, mais seulement publié en 1870 sous le titre *Effet du mouvement sur le ton des vibrations sonores et sur la longueur d'onde des rayons de lumière*<sup>3</sup>. Fizeau, le premier, insiste sur la différence entre la couleur d'une source provenant de l'émission continue et peu influencée par le mouvement de l'observateur ou de la source, et le cas des raies spectrales qui sont déplacées vers le bleu ou le rouge et produisent un effet mesurable. L'extrait du texte de la figure 4 montre bien que le physicien avait conscience des applications astronomiques fondamentales qui découleraient de la mesure du décalage spectral. L'effet est toujours appelé Doppler-Fizeau en France, et cette dénomination était commune (voire même effet Fizeau tout court) dans toutes les publications de vitesses radiales de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, avant que l'habitude ne soit prise de n'y faire référence que par l'appellation tronquée d'effet Doppler.

On remarquera que le résultat ne dépend que de la vitesse du corps lumineux et nullement de sa distance. De semblables observations pourraient donc conduire à des données sur les vitesses propres des astres les plus éloignés, et, dans certains cas, sur leurs distances; pour certaines étoiles doubles, par exemple, dont on connaît les éléments et la durée de la révolution, il suffirait de connaître leurs vitesses propres pour pouvoir déterminer leurs distances.

Fig.4. Extrait de l'article de H. Fizeau de 1870 dans les *Ann. de Chimie et Physique*, correspondant à sa communication de 1848 à la Société Philomatique de Paris.


À noter que Ernst Mach (1838-1916) discute également en 1860 de l'effet du mouvement sur la longueur d'onde de la lumière en des termes similaires à ceux de Fizeau.

<sup>3</sup> Annales de chimie et de physique, Vol. 19, Serie IV, 1870, p. 211-221.

Le principe fondamental de l'effet Doppler-Fizeau est purement lié à la cinématique de la propagation d'un signal émis à partir d'une source mobile par rapport à un observateur. La notion d'onde est secondaire car tout autre moyen de propagation à vitesse constante convient, comme cela est illustré sur la figure 5. Si deux signaux sont séparés par un intervalle  $T_0$  dans le référentiel de la source, alors l'intervalle de réception de ces deux mêmes signaux (flash de lumière, crête d'une onde, paquet postal, coup de canon, éclipse des satellites de Jupiter, etc.) est donné par

$$T = T_0 (1 + v/c)$$

avec  $v$  pour la vitesse radiale de la source et  $c$  la célérité de la propagation par rapport à l'observateur.



**Fig.5.** Principe de l'effet Doppler-Fizeau à partir d'une source en mouvement produisant un signal périodique se propageant jusqu'à l'observateur. L'intervalle entre deux émissions ( $T$ ) est différent de l'intervalle entre deux réceptions ( $T'$ ).

Dans le cas d'un signal ondulatoire de longueur d'onde  $\lambda$  dans le référentiel de la source, on obtient :  $\Delta\lambda/\lambda = v/c$  (voir page 10).

### Mesures des vitesses radiales

Avec une vitesse radiale comparable à celle de la Terre autour du Soleil, soit  $30 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , le décalage des raies  $\Delta\lambda/\lambda$  est de l'ordre de  $10^{-4}$ , ce qui nécessite des spectroscopes ou spectrographes avec un pouvoir de résolution élevé, d'autant plus que l'objectif est d'atteindre des précisions meilleures que le  $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$ .

Historiquement la spectroscopie astronomique s'est avant tout préoccupée de l'analyse des spectres pour comprendre la physique de l'atmosphère des étoiles et des nébuleuses (s'agissait-il d'étoiles agglomérées ou de nuages de gaz chaud ?) et reconnaître la composition chimique des astres. J. Fraunhofer (1787-1826) en a été le déchiffreur initial sur le spectre solaire, mais le véritable pionnier de la spectroscopie astronomique stellaire est le britannique Sir W. Huggins (1824-1910) à partir de 1863. Ce n'est pas un astronome au sens classique du terme et il a dû faire face au scepticisme des astronomes du sérail pour imposer une technique totalement nouvelle, venant d'une autre discipline,

qui s'est avérée aussi féconde pour la connaissance des astres que l'arrivée des lunettes et des télescopes dans les siècles précédents. Les aspects théoriques concernant l'absorption et l'émission par les gaz chauds sont l'œuvre de G. Kirchhoff (1824-1887) et R. Bunsen (1811-1899) en 1859 et 1860 à l'Université de Heidelberg. Ce travail exceptionnel marque le véritable début de l'astrophysique et une évolution irréversible de l'astronomie.

Dès 1868, les premiers essais ont été entrepris pour détecter un éventuel décalage spectral entre le spectre d'une étoile et un spectre de référence produit en laboratoire. La méthode était visuelle et le manque de lumière sur un spectre fortement dispersé rendait la mesure extrêmement difficile, voire impossible, très exigeante pour la vue des observateurs, et de toute façon uniquement envisageable pour les étoiles les plus brillantes. Huggins communique un premier résultat avec la vitesse radiale de Sirius à  $+46 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , corrigée de la vitesse de la Terre autour du Soleil. Bien que totalement erronée en signe et en valeur, c'est bien la première tentative de détermination à partir de l'effet Doppler-Fizeau, à un moment où la réalité de l'effet n'était pas établie. Plus tard l'erreur probable des mesures visuelles a été estimée à environ  $20 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , un niveau qui les rendait marginalement utiles pour l'astronomie. Les erreurs systématiques étaient probablement encore plus élevées. Si l'on prend par exemple les 48 étoiles mesurées au Temple Observatory dans les années 1880, elles aboutissent à de grandes valeurs toutes négatives, ce qui est pour le moins suspect<sup>4</sup>.

Ce n'est qu'avec le couplage des spectroscopes et de la photographie (donc la construction des spectrographes) que des résultats réalistes et précis furent obtenus dans les années 1890 avec H.C. Vogel (1841-1907) et J. Scheiner (1858-1914 à Potsdam), les véritables fondateurs de la spectrographie des vitesses radiales. La mise en évidence directe de la rotation du Soleil par la différence des vitesses radiales aux deux bords et la modulation des vitesses radiales par le mouvement orbital de la Terre apportèrent la confirmation ultime de la réalité de l'effet Doppler-Fizeau et de sa relation avec les mouvements radiaux des sources relativement aux observateurs. Mais la découverte la plus extraordinaire faite par Vogel a été la détection des étoiles binaires spectroscopiques et la preuve que les variations d'éclat de l'étoile variable Algol était en relation avec un mouvement orbital d'un astre peu lumineux qui passait périodiquement devant le disque d'Algol. Les systèmes binaires spectroscopiques sont des étoiles doubles non

<sup>4</sup> Voir J.B. Hearnshaw, The analysis of starlight, Cambridge.

résolues visuellement et dont le mouvement orbital est mis en évidence par la variation périodique de la vitesse radiale, donc par la spectroscopie. La détection des planètes extrasolaires par la méthode des vitesses radiales est une méthode tout à fait similaire, mais avec une répétabilité meilleure que le  $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ . À noter que l'on cherche ici des variations de vitesse au cours du temps et que l'exactitude est moins importante que la précision. Un biais constant sur la vitesse radiale n'empêche pas la détection de la modulation de la vitesse au cours du mouvement orbital de la planète.

Une première liste de vitesses radiales rapportées au Soleil est publiée en 1892 pour 51 étoiles, avec une précision de  $2\text{-}3 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , soit d'un seul coup une amélioration d'un ordre de grandeur par rapport aux mesures visuelles. À titre d'illustration, la vitesse radiale de Sirius est trouvée à  $-9,1 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$  et celle de Véga à  $-15,2 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$  alors que les valeurs modernes sont respectivement de  $-7,6$  et  $-13,9 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ .

C'est le démarrage d'une collecte laborieuse et à faible rendement à laquelle vont s'atteler la plupart des grands observatoires en Europe, en Russie et aux États-Unis. La découverte d'étoiles présentant des vitesses radiales supérieures à  $75 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$  en relation avec leur position dans le plan galactique est à l'origine de la découverte de la rotation galactique, un résultat fondamental dans l'histoire de l'astronomie. Au début des années 1920, les vitesses radiales sont connues pour environ 2 000 étoiles avec un accroissement annuel de 250 nouvelles étoiles. Le catalogue général des vitesses radiales contient les résultats pour environ 7 000 étoiles en 1931, puis 15 000 dans les années 1960 et environ 50 000 autour de l'an 2000 avant l'arrivée des relevés à plus grand champ et l'obtention simultanée de nombreux spectres. En 2015, on connaît les vitesses radiales pour un maximum de 500 000 étoiles et Gaia va en fournir plusieurs millions en 2018 et probablement 100 millions en 2022.

### Mesures brutes et mesures normalisées

Le décalage spectral mesuré depuis un observatoire terrestre conduit à la vitesse radiale de la source par rapport à l'observateur à l'époque de la mesure. L'observateur est entraîné par la rotation de la Terre, par le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil et par le petit mouvement de la Terre autour du barycentre du système Terre-Lune, autant de corrections à effectuer pour parvenir à une vitesse radiale standard, qui se rapporte à un point moins mobile, ou plus précisément dont la vitesse de déplacement n'est pas soumise à des variations

rapides. Le point de référence choisi est le barycentre du Système solaire, puisque sa position et sa vitesse par rapport aux étoiles n'est l'objet de changements notables que sur des durées très longues associées à la rotation galactique. Les ordres de grandeur de ces effets sont aisés à estimer :

- Mouvement de rotation de la Terre :

$V \approx 0,460 \times \cos \varphi \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , fonction de la latitude  $\varphi$ .

- Mouvement orbital de la Terre  $V \approx 29,8 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ , dans le plan de l'écliptique et légèrement variable ( $\pm 0,5 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ ) au cours de l'année.

- Mouvement du Soleil autour du barycentre du Système solaire, de l'ordre de grandeur de  $0,02 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$  et dominé par la période orbitale de Jupiter.

- Mouvement autour du barycentre du système Terre-Lune : variation mensuelle d'amplitude  $0,012 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ .

Toutes ces vitesses doivent être projetées sur la ligne de visée pour chaque observation et comptées avec le bon signe ! En pratique les trois dernières contributions apparaissent automatiquement dans la vitesse de la Terre prise dans une éphéméride de bonne précision rapportée au barycentre du Système solaire. D'autres corrections proviennent de l'étoile elle-même, puisque le champ de gravitation est aussi la source d'un petit décalage spectral (dilatation du temps en fonction du potentiel gravitationnel), et que la surface de l'étoile est agitée par des mouvements convectifs de matière dont la moyenne n'est pas nulle. Des mesures répétées au cours des mois et des années mettent en évidence des variations de vitesses radiales pour de nombreuses étoiles provenant cette fois-ci du mouvement variable de l'étoile si le système est multiple ou bien si elle est accompagnée par un système planétaire.

### Utilisation des vitesses radiales

Je me concentre ici sur les vitesses radiales, mais la spectroscopie en astronomie est bien plus riche que l'aspect cinématique et touche à la composition des astres, à l'évolution des étoiles et des galaxies, à l'histoire de l'Univers, de nombreux domaines qui exploitent les spectres mais pas nécessairement les décalages spectraux.

### Parallaxes statistiques

En premier lieu la vitesse radiale fournit la troisième composante du mouvement, le long de la ligne de visée, comme une mesure réelle et non comme une projection angulaire. Considérons un grand nombre d'étoiles dont on possède le mouvement tangentiel angulaire et la vitesse radiale en  $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$ .

Statistiquement, la valeur du mouvement tangentiel en  $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$  ne doit pas être très différente de la vitesse radiale. Donc on peut obtenir une estimation statistique de la parallaxe, donc de la distance, exactement ce qu'avait déjà mentionné Fizeau dans l'extrait de la figure 4. L'application à des étoiles individuelles est limitée, mais la méthode est très efficace pour les étoiles groupées en amas dont les directions de déplacement dans l'espace sont parallèles les unes aux autres.

### Étoiles binaires spectroscopiques

Il s'agit ici de système comportant deux étoiles trop proches l'une de l'autre pour que les composantes puissent être résolues par une observation télescopique mais dont le mouvement orbital (d'une seule ou des deux composantes) est décelé par la variation périodique de la vitesse radiale. Considérons une étoile binaire avec des composantes  $E_1$  et  $E_2$  en orbite autour du centre de gravité du système. La théorie du mouvement elliptique dans l'espace permet de calculer la vitesse radiale d'une composante. La figure 6 donne l'allure des courbes de vitesses pour différentes valeurs de l'excentricité. L'amplitude est prise égale à  $10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$  et la vitesse radiale du système est de 0.

Si le spectre de l'étoile  $E_1$ , ou des deux étoiles  $E_1$  et  $E_2$ , est observable, on parvient à suivre les variations de la vitesse radiale au cours de l'orbite et à déterminer la période  $P$  ainsi que les éléments

géométriques de l'orbite et finalement donner une contrainte sur les masses. L'inclinaison  $i$  de l'orbite sur le plan du ciel ne permet pas d'avoir la dimension réelle de l'orbite, mais seulement  $a_1 \sin i$  ( $a_1$  étant le demi-grand axe de l'orbite absolue de  $E_1$ ) et éventuellement  $a_2 \sin i$  et cette ambiguïté ne peut être levée que par des mesures astrométriques complémentaires, ou photométriques si l'étoile est également une binaire à éclipse, comme Algol.




Fig.6. Courbes de la vitesse radiale d'une composante d'une étoile binaire spectroscopique pour différentes valeurs de l'excentricité.

Vous trouverez sur notre site l'article complet de François Mignard que nous avons dû réduire ici pour des problèmes de place. Vous y trouverez en particulier des calculs sur les variations de coordonnées, sur le mouvement propre des étoiles ou sur le mouvement elliptique des étoiles doubles.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2						■	■				
3								■			
4			■							■	
5										■	
6			■			■			■		
7		■						■			
8				■							
9	■							■			

#### Horizontalement

1. Indispensable pour parler de vitesse.
2. Sa vitesse n'est pas nulle. Norme.
3. Il pensait que la couleur des étoiles venait de leur vitesse radiale. Vous pouvez en faire un au CLEA.
4. Astronomie de l'invisible. À bonne vitesse.
5. Comme l'objectif du satellite Gaia.
6. Article. Note. Sa vitesse dépend du processeur. On trouve une de ses raies d'absorption au milieu du doublet du sodium.

7. Celui du Soleil se fait plus vite à l'équateur que chez nous. La vitesse du son dépend de sa température.
8. Programme spatial suisse. Plus on va vite, plus on en consomme.
9. Vite. Ils ont trop roulés.

#### Verticalement

1. Vitesses d'approche ou d'éloignement.
2. Comme la vitesse d'Arcturus. On peut y dépasser la vitesse de la lumière.
3. Radio mais pas astronomie. La deuxième a trait aux vitesses.
4. Ascendant.
5. Comme toutes les vitesses.
6. 15<sup>e</sup> étoile la plus brillante. Elle doit dépasser les  $8 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ .
7. Ce ne sont pas de tristes sires.
8. Possessif. Grand ou petit, il voit bien la nuit. Le suffixe du site du CLEA.
9. Celui des Cahiers Clairaut se trouve sur le site du CLEA. 40 pour les Cahiers Clairaut.
10. Son observatoire est dans le sud. Son observatoire est dans le Sud.
11. Comme des vitesses qui ne sont pas angulaires.

Solution p. 40